

IEO Istituto Europeo di Oncologia
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico
Via Ripamonti 435 20141 Milano

T +39 02 57489.1 F +39 02 57489.208
E info@ieo.it W www.ieo.it

Chirurgia Cervico Facciale
T +39 02 57489.490
E divisione.chirurgiacervicofacciale@ieo.it

IEO Informa



L'HPV orale

A cura
della Divisione di Chirurgia Cervico Facciale

Lo IEO è accreditato
Joint Commission





Le neoplasie del cavo orale e dell'orofaringe sono patologie rare legate a diversi fattori di rischio tra cui soprattutto alcol e fumo. Recenti studi hanno dimostrato che circa il 15 % delle neoplasie del cavo orale e il 38 % delle neoplasie dell'orofaringe sono legate all'infezione da HPV. La presenza del virus nel cavo orale è molto frequente e non rappresenta una malattia. I soggetti che presentano una positività virale a livello genitale o anale hanno una probabilità aumentata di avere il virus anche a livello orale; quest'ultima può essere documentata direttamente tramite brushing (passaggio di uno spazzolino) sulla mucosa orale.

Come molti tumori anche quelli del cavo orale possono essere preceduti da lesioni precancerose che possono manifestarsi come ulcere o ferite che non guariscono spontaneamente, macchie bianche (leucoplachie, in foto 1) o macchie rosse (eritroplachie, in foto 2).



Foto 1: macchie bianche (leucoplachie)



Foto 2: macchie rosse (eritroplachie)

L'individuazione precoce di tali lesioni consente una cura tempestiva. Spesso il medico richiede di eseguire una biopsia (piccolo prelievo di tessuto in anestesia locale) che ci indica il tipo esatto di lesione e la sua potenzialità di trasformazione maligna.

Le lesioni neoplastiche dell'orofaringe invece sono più difficili da individuare: per un esame completo è necessario eseguire una visita con fibroscopio, un sottile sondino che viene introdotto nel naso e portato a livello della base della lingua e della laringe per la ricerca di eventuali lesioni. L'esame provoca un lieve fastidio, ma è assolutamente indolore e non richiede la sedazione per essere eseguito. E' possibile effettuare la ricerca dell'HPV orale anche durante la visita otorinolaringoiatrica o ginecologica oppure previo appuntamento presso l'ambulatorio che esegue i pap test, per entrambi i sessi. Se il test per l'HPV orale risultasse positivo, le consigliamo di fare una visita otorinolaringoiatrica completa con fibroscopia.

Per richiedere una visita otorinolaringoiatrica è necessario munirsi di 2 impegnative:

- una per visita orl
- una per fibrolaringoscopia

Per eseguire la ricerca dell' HPV orale è necessario munirsi di ulteriori 2 impegnative:

- una per Brushing cavo orale
- una per Esame citologico e ricerca HPV