

TUMORE OVARICO: conoscere è importante

Il tumore ovarico è un tumore ginecologico che origina dalla superficie delle ovaie. I tumori ovarici benigni non provocano metastasi, mentre quelli maligni possono metastatizzare in diversi distretti corporei.

Non si conoscono lesioni precancerose del tumore ovarico; per questo motivo non ci sono screening preventivi. Tuttavia per determinati fattori è stata dimostrata una riduzione o un aumento del rischio. Una maggiore attenzione a questi fattori può dunque portare ad una diagnosi tempestiva che aiuta a individuare e a curare il tumore ad uno stadio anche iniziale con buone prospettive di guarigione.

Fattori di rischio per il tumore ovarico:

- Nulliparità
- Prima gravidanza dopo i 35 anni
- Terapia sostitutiva ormonale
- Menarca precoce
- Menopausa tardiva
- Stato infiammatorio persistente della pelvi (malattia infiammatoria pelvica)
- Stimolazione ovarica per fecondazione in vitro
- Tumore alla mammella diagnosticato in giovane età
- Endometriosi
- Mutazione BRCA1, BRCA2
- Sindrome di Lynch tipo II.

Fattori protettivi per il tumore ovarico:

- Età inferiore o uguale a 25 anni alla prima gravidanza
- Alto numero di gravidanze
- Impiego di contraccettivi orali
- Allattamento al seno
- Chirurgia profilattica
- Sorveglianza

Questa campagna è permessa grazie al supporto di:



I sintomi

Il tumore dell'ovaio non dà sintomi nelle fasi iniziali, e quando i sintomi compaiono sono comunque generici e riferibili ad alte patologie minori. Per questo è molto importante imparare a riconoscere per tempo i segnali che possono essere correlati alla malattia; se si tratta di sintomi che si manifestano ogni giorno per più di 12-15 giorni al mese e per qualche mese consecutivo, è consigliabile rivolgersi al ginecologo.

Sintomi principali:

- gonfiore persistente dell'addome;
- fitte addominali
- bisogno frequente di urinare
- sensazione di sazietà anche a stomaco vuoto
- perdite ematiche vaginali
- mutamenti nelle abitudini intestinali

La diagnosi

Una diagnosi tempestiva può migliorare significativamente la prognosi. Se si manifestano i sintomi, è consigliabile sottoporsi a:

- visita medica e ginecologica
- ecografia trans-vaginale
- valutazione dei marcatori tumorali
- tc addominale e PET

Questa campagna è permessa grazie al supporto di:

